

Solcoseryl pasta .INPH

Cena: 34,58 PLN



Opis słownikowy

Dawka	(2,125mg+0,01g)/g
Opakowanie	5 g
Postać	pasta do stos.w j.ustnej
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt, Polidocanolum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Inpharm Sp. Z.O.O

ILOŚĆ: 5 g

OPIS:

Solcoseryl to lek do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej, dziąseł i warg jak afty, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne, bolesne zmiany, opryszczka wargowa.

DZIAŁANIE:

Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt stymuluje w komórkach tlenowe procesy metaboliczne i zwiększa ilość substancji dostarczających komórkom energii. Ponadto aktywuje transport tlenu i substancji odżywczych do komórek oraz ułatwia ich przyswajanie. Dzięki temu ułatwia procesy regeneracyjne i naprawcze w obrębie komórek i przyspiesza odnowę tkanek. Polidokanol działa znieczulająco i powoduje szybkie i trwałe ustąpienie bólu. Podłoże pasty pod wpływem działania śliny i wydzielin pochodzących z rany tworzy elastyczną błonę przylegającą do zmienionej chorobowo powierzchni błony śluzowej chroniącą ją przed podrażnieniem w trakcie spożywania pokarmów.

WSKAZANIA:

Do stosowania w bolesnych oraz zapalnych schorzeniach błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł i warg: aftach, ragadach (rozpadlinach), opryszczce wargowej, zapaleniu dziąseł, zapaleniu tkanki przyzębia, zapaleniu jamy ustnej; w bólach uciskowych spowodowanych przez protezy dentystyczne; w bólach występujących w trakcie wyrzynania się zębów mądrości; jako opatrunek po takich zabiegach jak: nałożenie koronki, łyżeczkowanie i usunięcie zęba oraz po założeniu protez bezpośrednich.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek jest przeznaczony do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej. Pasek pasty o długości ok. 0,5cm nakłada się cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsce od 3 do 5 razy na dobę. Lek należy stosować aż do ustąpienia objawów. Szczególnie korzystne jest stosowanie przed snem. Pasty nie należy wcierać ani rozcierać. Aby dobrze przylegała, należy ją nakładać suchym palcem, a miejsce, na które ma być podana należy wcześniej wysuszyć.

SKŁAD:

Substancjami czynnymi są: bezbiałkowy dializat z krwi cieląt, polidokanol. 1 g pasty zawiera 2,125 mg bezbiałkowego dializatu z krwi cieląt i 10 mg polidokanolu. Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karmeloza sodowa, mentol, olejek mięty pieprzowej, żelatyna, pektyna, polietylen, parafina ciekła.

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować leku w przypadku uczulenia na bezbiałkowy dializat z krwi cieląt, polidokanol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, nie stosować u dzieci.

Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku ostrego zakażenia w obrębie zmiany chorobowej.

Leku nie stosować do wnętrza ran, szczególnie tych, które powinny być leczone z użyciem szwów (np. rany po ekstrakcji zębów trzonowych, wklinowanych, mądrości).

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby wynosi 28 dni.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.