

# Sonol płyn do stos.na skórę 8 g

Cena: 18,92 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	(0,021g+2mg+0,021g)/ml
Opakowanie	8 g
Postać	płyn do stos.na skór.
Producent	ELANDA PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Mentholum, Thymolum, Acidum salicylosalicylicum

## Opis produktu

### Sonol płyn

jest to lek w formie płynu stosowany zewnętrznie jako środek pomocniczy w leczeniu chorób infekcyjnych skóry.

**Działanie:** preparat łagodzący choroby skóry. Zawarty w preparacie mentol posiada właściwości bakteriobójcze, znieczulające i przeciwświądowe. Tymol i kwas salicylowy wzmagają je i zapobiegają namnażaniu się bakterii, potęgują antyseptyczne działanie leku.

**Sposób użycia:** młodzież powyżej 12 lat i dorośli: miejsca swędzące i wykwyty na wargach smarować cienko i równomiernie początkowo 4-5 razy na dobę, gdy nastąpi poprawa 2-3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

**Skład:** 1ml płynu zawiera: substancje czynne: lewomentol 21mg, kwas salicylowy 21mg, tymol 2mg. Pozostałe składniki:glikol propylenowy.

**Przeciwwskazania:** uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; uszkodzona skóra; otwarte rany; rozległe zmiany złuszczone (np. w łuszczycy). Nie stosować: u pacjentek w ciąży bez konsultacji z lekarzem; u pacjentek karmiących piersią bez konsultacji z lekarzem; na błony śluzowe; u dzieci poniżej 12 lat.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:** przed rozpoczęciem stosowania leku Sonol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Ponieważ kwas salicylowy bardzo łatwo wchłania się przez skórę nie powinien być stosowany na dużych obszarach skóry przez długi czas, szczególnie u dzieci. Lek Sonol zawiera glikol propylenowy, może powodować podrażnienie skóry.

**Interakcje z innymi lekami:** należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi składniki złuszczone, np. rezorcynol, siarkę, ponieważ może nastąpić podrażnienie skóry.

**Ciąża i karmienie piersią:** jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia, bez konsultacji z lekarzem.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:** lek Sonol nie ma wpływu na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.