

Tabex 1,5mg 100 tabl



Cena: 41,47 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg
Opakowanie	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)
Postać	tabl.powl.
Producent	SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Cytisinum

Opis produktu

TABEX Leczy uzależnienie od nikotyny.

DZIAŁANIE:

Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku TABEX pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku TABEX jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Substancją czynną preparatu TABEX, jest alkaloid cytozyny. Działanie cytyzyny jest podobne do nikotyny. Cytyzyna wchłonięta z preparatu TABEX, ze względu na podobny mechanizm działania stopniowo wypiera nikotynę, konkurując z nią o te same receptory. Pozwala to na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie się od palenia tytoniu bez objawów abstynencji. U palaczy stosujących preparat TABEX stopniowo zmniejsza się zapotrzebowanie na nikotynę co pozwala zmniejszyć liczbę wypalanych papierosów. Należy podkreślić, że osiągnięcie wyleczenia wymaga od osoby palącej silnej woli pozbycia się nałogu palenie tytoniu!

WSKAZANIA:

Uzależnienie od nikotyny

DAWKOWANIE:

Kurację należy rozpocząć od przyjmowania preparatu TABEX doustnie, w ciągu 3 pierwszych dni, po 1 tabletkę co 2 godziny (6 tabletek dziennie), stopniowo zmniejszając liczbę wypalanych papierosów.

Od 4 do 12 dnia należy przyjmować po 1 tabletkę co 2 i pół godziny (5 tabletek dziennie).

Od 13 do 16 dnia należy przyjmować po 1 tabletkę co 3 godziny (4 tabletki dziennie).

Od 17 do 20 dnia należy przyjmować po 1 tabletkę co 5 godzin (3 tabletki dziennie).

Od 21 do 25 dnia należy przyjmować 1-2 tabletki dziennie.

Osoba paląca powinna definitywnie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.

Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie powinna pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanych wyników terapii. Terapię można powtórzyć po 4-5 miesiącach

SKŁAD:

Substancja czynna: cytyzyna 1,5 mg

Substancja pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokryształiczna, talk, stearynian magnezu do 100 mg.

Skład otoczki: hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek, polietylenoglikol 3000, tracetyna, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

OSTRZEŻENIA:

TABEX należy ostrożnie stosować w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnic, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych postaci schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.

Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

TABEX powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu. Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do wzmożenia działań niepożądanych nikotyny.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.