

Tantum Verde Cytrynowy 30 pastylek



Cena: 27,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka	3 mg
Opakowanie	30 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A
Rejestracja	
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Angellini Pharma Polska

ILOŚĆ: 30 pastylek

LekTantum Verde smak cytrynowy zawiera substancję czynną - benzydaminę, należącą do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego i ogólnego.

DZIAŁANIE:

Benzydamina charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco. Lek miejscowo dobrze się wchłania osiągając duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. Lek jest na ogół dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

WSKAZANIA:

Lek stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

DAWKOWANIE:

Należy ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

SKŁAD:

1 pastylka zawiera substancje aktywne: 3mg benzydaminu chlorowodoru; substancje pomocnicze: izomalt, kwas cytrynowy jednowodny, kompozycja smakowo- zapachowa cytrynowa (butylohydroksyanizol, citral, olejek cytrynowy), kompozycja smakowo- zapachowa miętowa (mentol, octan mentylu, olejek mięty zielonej, olejek mięty pieprzowej), aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132). Każda pastylka zawiera 3,26mg aspartamu.

OSTRZEŻENIA:

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat, lek Tantum Verde smak cytrynowy powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.