

Tantum Verde Smak Eukaliptusowy 30 pastylek

Cena: 23,33 PLN



Opis słownikowy

Dawka	3 mg
Opakowanie	30 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A
Rejestracja	
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Podleśna 83

ILOŚĆ: 30 pastylek do ssania

TANTUM VERDE zawiera substancję czynną benzydaminu hydrochloridum należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (NLPZ)

DZIAŁANIE:

Benzydamina charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa miejscowo znieczulająco i odkażająco. Lek miejscowo dobrze się wchłania osiągając duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. Lek jest na ogół dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

WSKAZANIA:

Lek stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

DAWKOWANIE:

O ile lekarz nie zaleci inaczej należy ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę.

SKŁAD:

Substancją czynną leku Tantum Verde smak eukaliptusowy jest benzydminy chlorowodorek.

Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydminy chlorowodorku.

- Pozostałe składniki to: izomalt (E 593), olejek eukaliptusowy, kwas cytrynowy jednowodny, acesulfam potasowy, lewomentol, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132)..

OSTRZEŻENIA:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tantum Verde smak eukaliptusowy należy omówić to z

lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania leku jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa, gdyż może on spowodować duszność.

Jeśli objawy zapalenia w jamie ustnej np. owrzodzenie, nie złączą ustępować po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ u niektórych pacjentów

owrzodzenie jamy ustnej może być objawem innego ciężkiego procesu chorobowego.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.