

Theraflu Total Grip (Theraflu Max) 10 saszetek



Cena: 29,57 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1g+0,0122g+0,2g
Opakowanie	10 sasz.
Postać	prosz.do sp.rozt.doust.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamolum, Guaifenesinum, Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: GLAXOSMITHKLINE

ILOŚĆ: 10 saszetek

OPIS:

Theraflu Total Grip to lek wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy. Objawy te obejmują łagodne i umiarkowane bóle, gorączkę, uczucie zatkanego nosa (zablokowany nos) oraz mokry kaszel.

DZIAŁANIE:

Lek zawiera trzy substancje czynne: paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo (obniża temperaturę ciała w przypadku gorączki), chlorowodorek fenylefryny zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz odblokowuje zatknięty nos i ułatwia oddychanie poprzez zmniejszenie obrzęku w przewodach nosowych; gwajafenezyna jest lekiem wykrztuśnym, który rozrzedza wydzielinę (flegmę) i zmniejsza nasilenie mokrego kaszlu.

WSKAZANIA:

Lek Theraflu Total Grip należy przyjmować tylko wtedy, gdy występują wszystkie z następujących objawów: ból i (lub) gorączka, zablokowany nos i kaszel z odkrztuszaniem. Lek Theraflu Total Grip jest wskazany do stosowania tylko u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz u młodzieży w wieku 16 lat i starszej.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

U osób dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży w wieku 16 lat i starszej o masie ciała 50 kg lub większej; przyjmować 1 saszetkę co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Nie należy przyjmować więcej niż 3 saszetki na dobę. Nie stosować leku dłużej niż przez 3 dni. Należy skontaktować się z lekarzem, w przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni lub ich nasilenia albo, jeśli kaszlowi towarzyszy wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy.

SKŁAD:

1 saszetka zawiera substancje czynne: paracetamolu 1000 mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg (co odpowiada 5 mg fenylefryny zasady) oraz gwajafenezyna 200 mg. Pozostałe składniki to: sacharoza, cytrynian sodu, kwas cytrynowy bezwodny, kwas winowy, aromat cytrynowy 87A069, aromat cytrynowy 875060 (zawiera butylohydroksyanizol), aromat mentolowy 876026, acesulfam potasowy (E950), aromat cytrynowy 501.476/AP05.04, aspartam (E951), aromat cytrynowy 875928, żółcień chinolinowa (E104).

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować leku w przypadku uczulenia na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku; nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni C.

Nie stosować, jeśli występują: choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, guz chromochłonny nadnerczy, pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne.

Nie stosować u pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.