

Tran Hasco 500mg 60kaps.(4x15)



Cena: 22,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	60 kaps. (4x15)
Postać	kaps.miękkie
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Oleum Jecoris Aselli

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
PRODUCENT: HASCO- LEK
ILOŚĆ: 60 kapsułek

TRAN HASCO, 500 mg, kapsułki miękkie

DZIAŁANIE:

Produkt leczniczy stosowany:

w profilaktyce i wspomagająco w leczeniu niedoborów witamin A i D, zwłaszcza u dzieci (wzmacnia kości i zęby, poprawia stan skóry i narządu wzroku)
w zapobieganiu krzywicy
w zaburzeniach uwapnienia tkanki kostnej różnego pochodzenia
w łagodzeniu skutków menopauzy, takich jak osteoporoza, atrofia skóry i błon śluzowych

WSKAZANIA:

Jako środek wzmacniająco-regenerujący stosowany jest w okresie rekonwalescencji po przebytych schorzeniach osłabiających ogólną sprawność i odporność organizmu.

DAWKOWANIE:

Lek do stosowania doustnego. O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się 2 do 4 kapsułek 2 razy na dobę. Dzieci od lat 4:1 do 2 kapsułek na dobę.

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera: substancję czynną:

Olej wątlusowy (typ B) 500 mg o zawartości: Witamina A 300-1250 j.m. Cholekalcyferol 30-125 j.m.

Kwas eikozapentaenowy (EPA) 35-80 mg Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 30-90 mg substancje pomocnicze Skład otoczki żelatynowej: żelatyna, gliceril.

OSTRZEŻENIA:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Hiperkalcemia, kamica nerkowa

Kiedy nie stosować leku Tran Hasco- jeżeli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku-w przypadku hiperkalcemii i kamicy nerkowej. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tran Hasco- ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą (nadwrażliwość na wit. D)-bez wskazań lekarza nie należy przekraczać dawki 8 kapsułek na dobę. Stosowanie leku Tran Hasco z innymi lekami

2/3. Jednoczesne podawanie cholestyraminy lub oleju parafinowego zmniejsza wchłanianie witaminy A i D na poziomie jelit. Wchłanianie witaminy A jest osłabione przy podawaniu neomycyny, a witaminy D -u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe i barbiturany. Ze względu na obecność w tranie witaminy D ostrożnie stosować razem z glikozydami naparstnicy. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Duże dawki wit. A mogą spowodować zaburzenia rozwojowe płodu. Podczas ciąży i karmienia piersią lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po porozumieniu z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.