

Traumon żel 0,1 g/g 150 g



Cena: 69,95 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Dawka | 0,1 g/g |
| Opakowanie | 150 g |
| Postać | żel |
| Producent | MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | Etofenamatum |

Opis produktu

Traumon żel jest etofenamatem należący do grupy leków działających na układ mięśniowo-kostny, z grupy - niesteroidowe leki

przeciwzapalne do stosowania miejscowego.

DZIAŁANIE:

Etofenamat- substancja czynna leku Traumon działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Etofenamat należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i wykazuje wielopunktowy mechanizm działania na proces zapalny. Stosowany miejscowo wchłania się przez skórę i gromadzi w zmienionych zapalnie tkankach.

Stosowanie na skórę ogranicza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych typowych dla NLPZ podawanych doustnie. Traumon nie pozostawia na skórze tłustej warstwy.

WSKAZANIA:

tępe urazy takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów, choroba

zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych, reumatyzm pozastawowy (ból okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych), zapalenie nadkłykci.

DAWKOWANIE:

Jeśli lekarz nie zaleci, należy nałożyć pasek długości 5 do 10 cm leku Traumon żel na skórę w okolicy objętej bólem, pokrywając nim powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem i wcierać aż do całkowitego wchłonięcia się leku. Powtarzać 3 do 4 razy na dobę. Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3 do 4 tygodni, zaś tępych urazów (np. urazów sportowych)- do 2 tygodni.

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest etofenamat.

Inne składniki leku: karbomer 940, eter makrogolu oleinocetylowy, sodu wodorotlenek, alkohol izopropylowy, maktogol 400, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA:

Nie należy stosować u kobiet w ciąży. W okresie karmienia piersią w razie konieczności można zastosować lek krótkotrwale i na małej powierzchni skóry.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.