

UroFuraginum Max 100 mg 30 tabl.



Cena: 15,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Furozidinum

Opis produktu

Urofuraginum Max

DZIAŁANIE:

Substancja czynna leku Urofuraginum max hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenie dolnych dróg moczowych.

WSKAZANIA:

Leczenie zakażeń dolnych dróg moczowych

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 15 roku życia:

Pierwszy dzień stosowania: 400 mg na dobę w 4 dawkach podzielonych (1 tabletkę co 6 godzin); następne dni leczenia: 300 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych (1 tabletkę co 8 godzin).

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

uroFuraginum Max należy podawać podczas posiłków.

Jednocześnie stosować dietę bogatą w białko.

Lek należy popijać dużą ilością płynów.

Lek stosuje się zwykle 7-8 dni. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

SKŁAD:

Każda tabletkę zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typu A

OSTRZEŻENIA:

Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, I trymestr ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy, rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.