


# Vicks Antigrip Max na grypę i przeziębienie pomarańczowy 10 sasz

Cena: 26,44 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	(1g+16mg+4mg)/sasz.
Opakowanie	10 sasz.
Postać	gran.do sporz.roztw.doust.
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamol, Phenylephrinum, Chlorpheniraminum

## Opis produktu

## Vicks AntiGrip Max

to produkt leczniczy stosowany do leczenia objawów przeziębienia i grypy. Vicks AntiGrip Max zawiera 3 substancje czynne: paracetamol, fenylefrynę oraz chlorfenaminę. Takie połączenie łagodzi ból i gorączkę, zmniejsza ilość wydzieliny z nosa a także zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

## Wskazania

leczenie objawowe przeziębienia i grypy, które przebiegają z:

- gorączką,
- słabym lub umiarkowanym bólem głowy, mięśni, gardła zatok,
- obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z tworzeniem wydzieliny.

## Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryny wodorowinian (Phenylephrini hydrogenotartras) i chlorfenaminy maleinian (Chlorphenamini maleas).

1 saszetka zawiera: 1000 mg paracetamolu, 5,58 mg fenylefryny wodorowinianu, (czyli 8,21 mg fenylefryny), 4 mg chlorfenaminy maleinianu (co odpowiada 2,8 mg chlorfenaminy).

Substancje pomocnicze: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958.

## Dawkowanie

1 saszетка co 6-8 godzin.

Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

Dorośli o masie ciała poniżej 50 kg, pacjenci: odwodnieni, długotrwale niedożywieni, z przewlekłą chorobą alkoholową, z zespołem Gilberta: 1 saszетка 2-3 razy na dobę (co 6-8 godzin).

Jeżeli gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, objawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe, należy zwrócić się do lekarza.

## Przeciwwskazania

- u pacjentów uczulonych na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- u dzieci, z uwagi na dużą zawartość paracetamolu;
- jeśli pacjent choruje na: jaskrę, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, ciężką niewydolność nerek;
- jeśli pacjent cierpi na jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa);
- jeśli u pacjenta stwierdzono tachykardię (zbyt szybkie bicie serca);
- u pacjentów w podeszłym wieku bez konsultacji z lekarzem (może wystąpić bradykardia (wolne bicie serca) lub zmniejszenie pojemności minutowej serca);
- u pacjentów leczonych lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, (IMAO) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu

## Uwagi

- Należy zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem Vicks AntiGrip Max w następujących przypadkach: choroby nerek i płuc, rozrost gruczołu krokowego, cukrzyca, astma oskrzelowa, bardzo wolne bicie serca, hipotonia (zbyt niskie ciśnienie krwi), miażdżyca naczyń mózgowych, zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żołądka, zwężenie połączenia odźwiernika i dwunastnicy, choroby tarczycy, niedokrwistość, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.
- W przypadku przyjmowania dużych dawek paracetamolu lub przedłużonego leczenia może nastąpić uszkodzenie wątroby. Zgłaszano przypadki toksycznego działania na wątrobę w przypadku podania paracetamolu w dobowej dawce nie przekraczającej 4 g.
- W czasie leczenia nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.
- Pacjenci z chorobą alkoholową i regularnie pijący alkohol powinni zachować ostrożność i nie stosować więcej niż 2 saszetki Vicks AntiGrip Max (2 g paracetamolu) na dobę.
- Pacjenci chorujący na astmę uczuleni na kwas acetylosalicylowy i/lub leki przeciwhistaminowe powinni zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku.
- Lek zawiera mannitol, z tego względu może powodować łagodne działanie przeczyszczające.
- U pacjentów z niedokrwistością, chorobami serca, płuc i zaburzeniami czynności wątroby dozwolone jest stosowanie sporadyczne, jednakże należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku.
- Pacjenci wrażliwi na działanie leków uspokajających oraz pacjenci z padaczką powinni zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku, ponieważ może dojść u nich do nasilenia objawów choroby oraz wystąpienia interakcji z lekami stosowanymi do leczenia tych chorób.
- Jeśli u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi lub innymi lekami o podobnym działaniu pojawiają się dolegliwości żołądkowo-jelitowe, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Dolegliwości te mogą być wynikiem powstałej niedrożności porażennej jelit (zatrzymanie ruchów robaczkowych jelita, przesuujących treść pokarmową).
- Podczas stosowania paracetamolu istnieje większe ryzyko uszkodzenia wątroby u pacjentów: przyjmujących długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe; u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łąknienia, zakażeniem wirusem HIV, odwodnionych, głodzonych lub wyniszczonych; pijących regularnie alkohol; z chorobami wątroby (w tym zespołem Gilbert'a).
- Stosowanie Vicks AntiGrip Max może dać pozytywny wynik badania kontroli antydopingowej.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

