

Vigantolletten 500 j. m. 0,125mg 30 tabl.

Cena: 10,01 PLN



Opis słownikowy

Dawka	500 j.m. (0,0125 mg)
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.
Producent	PROCTER & GAMBLE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cholecalciferolum

Opis produktu

Lek VIGANTOLETTEN 500 j.m. 0,0125 mg 30 tabletek, zawiera 500 jednostek międzynarodowych witaminy D3

DZIAŁANIE:

Substancja czynna - cholekalcyferol (witamina D3) jest fizjologicznie wytwarzana w skórze pod wpływem ekspozycji na światło UV, może być też dostarczana do organizmu w diecie lub w postaci odpowiedniego leku.

Witamina D reguluje gospodarkę wapniową i fosforanową w organizmie.

Cholekalcyferol za pośrednictwem aktywnych metabolitów, zwiększa wchłanianie wapnia i fosforanów w przewodzie pokarmowym, wchłanianie zwrotne wapnia w nerkach oraz stężenie wapnia i fosforanów w krwi. Hamuje wydzielanie parathormonu z przytarczyc, ułatwia mineralizację kości i zapobiega utracie wapnia z organizmu.

Przy niedoborach witaminy D występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).

WSKAZANIA:

Zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych

zapobieganiu schorzeniom w przypadku stwierdzonego ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych

zapobieganiu niedoborom witaminy D w przypadku zaburzeń jej wchłaniania u dzieci i dorosłych

leczeniu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych

leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych

DAWKOWANIE:

Lek Vigantoletten 500 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zapobieganie krzywicy u noworodków, niemowląt i dzieci:

1 tabletkę leku Vigantoletten 500 na dobę (odpowiednik 12,5 mikrograma lub 500 j.m. witaminy D).

Zapobieganie schorzeniom w przypadku stwierdzonego ryzyka niedoboru witaminy D:

1 tabletkę leku Vigantoletten 500 na dobę (odpowiednik 12,5 mikrogramów lub 500 j.m. witaminy D)

Leczenie wspomagające w osteoporozie:

2 tabletki leku Vigantoletten 500 na dobę (odpowiednik 25 mikrogramów lub 1000 j.m. witaminy D).

Czas stosowania i sposób podawania leku

Noworodki, niemowlęta i małe dzieci

Należy rozpuścić tabletkę w wodzie na łyżeczce (do herbaty) i podać zawiesinę wodną dziecku bezpośrednio do ust, najlepiej podczas posiłku.

Nie zaleca się dodawania tak sporządzonej zawiesiny wodnej do zawartości butelki niemowlęcia (noworodka) lub innego jedzenia, gdyż wówczas nie można zagwarantować przyjęcia całej dawki leku. Jeśli jednak lek Vigantoletten w tabletkach musi zostać podany z pokarmem (płynnym), konieczne jest wcześniejsze zagotowanie pokarmu (mleka).

Wyznaczanie dawki zależy od zawartości witaminy D w pokarmie dziecka. Należy poinformować lekarza przepisującego lek Vigantoletten dziecku, jeśli stosuje się pokarm z dodatkiem witaminy D.

Dorośli

Należy zażywać tabletkę z wystarczającą ilością płynu.

Czas leczenia zależy od wskazania.

SKŁAD:

Każda tabletkę zawiera 12,5 mikrogramów cholekalcyferolu, co odpowiada 500 j.m. Witaminy D3 oraz substancje pomocnicze

OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.