


Xenna balance Junior prosz. 14 sasz.

Cena: 40,82 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	14 sasz.
Postać	prosz.do sp.rozt.doust.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: USP Zdrowie

ILOŚĆ: 14 saszetek

Xenna Balance Junior

DZIAŁANIE:

Xenna Balance Junior to nowoczesny preparat, który w naturalny sposób reguluje pracę jelit dziecka. Substancją aktywną produktu jest makrogl 3350, który dzięki wysokiej skuteczności i bezpieczeństwu jest obecnie środkiem nr 1 zalecanym w terapii zaparć u dzieci wg. Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii i żywienia dzieci ESPGHAN z 2014 roku.

Xenna Balance Junior ma postać proszku do sporządzania roztworu doustnego. Produkt posiada przyjemny pomarańczowy smak, jest dostępny w poręcznych saszetkach.

WSKAZANIA:

Zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnianie

Może być stosowany u dzieci od 6 miesiąca życia

Jest zalecany w leczeniu doraźnych, jak i przewlekłych zaparć

Jego skuteczność nie maleje przy dłuższym stosowaniu

DAWKOWANIE:

Zawartość saszetki należy rozpuścić w ¼ szklanki wody, soku lub herbaty (62,5 ml) i dobrze wymieszać, a następnie wypić.

Masa ciała (wiek) Liczba saszetek na dobę

Dzieci od 6 miesiąca życia do 2 lat (o masie ciała do 12 kg) 1-2 saszetki (5 g każda) na dzień

Dzieci od 2 do 11 roku życia (o masie ciała od 12 kg do 20 kg) 2-4 saszetki (5 g każda) na dzień

Dzieci powyżej 11 roku życia (lub o masie ciała powyżej 20 kg) 2-6 saszetek (5 g każda) na dzień

Dawkę dobową można podzielić i przyjmować w kilku porcjach w ciągu dnia. Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie. Maksymalna dawka dobową nie przekracza 6 saszetek.

SKŁAD:

Makrogol 3350, oraz substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sacharynian sodu.

OSTRZEŻENIA:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na inny składnik preparatu oraz w przypadku niedrożności jelit, w zapaleniu wyrostka robaczkowego, w przypadku ostrych chorób zapalnych jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), w przypadku bólów brzusznych nieznanego pochodzenia lub w stanach odwodnienia z ubytkiem elektrolitów. Produkt zawiera laktozę bezwodną, sacharozę oraz syrop glukozowy, suchy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Mogą występować różne skutki uboczne, takie jak:

- skurcze i bóle brzucha, biegunki z wodnistym stolcem, w szczególności u osób z zespołem nadpobudliwego jelita. Przewlekłe stosowanie może prowadzić do zaburzeń pigmentacji okrężnicy (zmiana koloru błony śluzowej jelita na brązowy), które ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu.
- reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka, wysypka występująca miejscowo lub na całym ciele;
- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie albuminuria (występowanie drobnocząsteczkowych białek w moczu), hematuria (występowanie krwi w moczu) w przypadku przewlekłego stosowania preparatu.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.