

## Zatoxin inhalacje roztw.do inhal. 10 fiolek



Cena: 36,59 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 fioł. po 3 ml
Postać	roztw.do inhal.
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

## Zatoxin Inhalacje

to roztwór do inhalacji, wskazany do stosowania aby przeciwdziałać i zapobiegać objawom wynikającym ze zmian w trofizmie nabłonka oddechowego, takich jak: kaszel, wyciek z nosa, ból typowy dla zespołu objawów grypy, ale także związanymi z alergenami zewnętrznymi. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci od 2. roku życia.

### Właściwości:

Zatoxin Inhalacje to hipertoniczny roztwór oparty na ekstraktach ziołowych: melisie lekarskiej, pachnotce zwyczajnej i macierzance piaskowej, w połączeniu z kwasem hialuronowym.

- Nebulizacja substancją nawilżającą, taką jak kwas hialuronowy przywraca poziom nawilżenia, przynosząc ulgę podrażnionej błonie śluzowej.
- Ekstrakty ziołowe wykazują działanie antyoksydacyjne i łagodzące przyczyniając się do przywrócenia fizjologicznej równowagi błony śluzowej dróg oddechowych.

Roztwór do inhalacji Zatoxin Inhalacje jest sterylny i nie zawiera konserwantów.

### Składniki:

Suchy wyciąg z melisy lekarskiej *Melissa officinalis* (kwas rozmarynowy 12%), suchy wyciąg z pachnotki zwyczajnej *Perilla frutescens* (polifenole 2,5%), suchy wyciąg z macierzanki piaskowej *Timo serpyllifolium*, kwas hialuronowy, chlorek sodu 2%, jednowodny jednozasadowy fosforan sodu, dwuwodny dwuzasadowy fosforan sodu, maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona do 100 ml.

### Stosowanie:

Do nebulizacji stosować 3 mililitrową fiołkę, 1 - 2 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniem lekarza, bez rozcieńczania. Produkt może być

używany ze wszystkimi rodzajami nebulizatorów.

**Ważne informacje:**

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do inhalacji, nie spożywać ani nie stosować w inny sposób niż wskazany w instrukcji używania.

Podawanie leków drogą wziewną jednocześnie z roztworem do inhalacji powinno odbywać się pod nadzorem lekarza, który może ocenić możliwe interakcje.

Nie stosować poniżej 2 roku życia, ponieważ w tym wieku cechy fizjologiczne dróg oddechowych wiążą się z ograniczoną zdolnością odprowadzania śluzu z oskrzeli. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.